



TRIFLURAT[®] EXTRUSADO

Alto teor de farináceos e tolerância à umidade proporcionando alta palatabilidade e atratividade

Modo de usar: Aplicar o raticida onde os roedores vivem e transitam como tocas, trilhas e túneis; Recomendação: 1 a 2 blocos por ponto de iscagem, porém é necessário avaliar o grau de infestação e tamanho da área a ser tratada, para determinar a quantidade de iscas em cada ponto de iscagem; Recomenda-se que os pontos de iscagem tenham uma distância de 5 a 10 metros entre eles e estejam devidamente identificados e mapeados; Os pontos de iscagem devem ser inspecionados após 7 a 10 dias para verificação do consumo e remanejamento nos locais onde as iscas não forem consumidas; Quando possível, recomenda-se dispor as iscas em caixas porta iscas, para proteção do raticida e dificultar o acesso para espécies não alvo do controle; É importante manter as caixas porta iscas fixadas, fechadas, identificadas e mapeadas; Os pontos de aplicação devem ser distantes ou fora do alcance de crianças e animais domésticos; Não aplicar o produto onde seja possível a contaminação de alimentos ou outros materiais. Recomenda-se colocar as iscas em caixas porta-isca, amarradas e inacessíveis a espécies não-alvo. Não colocar o produto onde seja possível a contaminação de alimentos.

Dose única

Alta atratividade e palatabilidade
Tolerância à umidade e calor
Indicado para manejo de resistência

Código Comercial

1 Kg

100.062

Composição

Flocoumafén 0,005% (p/p)

Formulação

Bloco extrusado de coloração azul

Indicações de uso

Raticida em bloco extrusado, indicado para áreas internas e externas, com teor de umidade, para uso profissional e em campanhas de saúde pública, no controle de ratos de telhado (*Rattus rattus*), ratazanas (*Rattus norvegicus*) e camundongos (*Mus musculus*). Pode ser aplicado em diversos locais como residências, indústrias, comércios, hospitais e escolas.

Mecanismo de ação

Raticida anticoagulante de segunda geração de dose única; interrompe o ciclo de formação da vitamina K1, necessária para a produção de vários fatores de coagulação do sangue; causando hemorragias e conseqüentemente a morte dos roedores. Ela ocorrerá de 3 à 7 dias após a ingestão da dose suficiente do raticida.

Apresentação

Embalagem de 1 Kg (blocos de 20 g, ensacados individualmente), caixa com 12 Kg.

Informações adicionais: Ratazanas e ratos de telhado costumam desconfiar de novos objetos dispostos no ambiente, o que pode dificultar a rápida ingestão da isca raticida, apesar de sua alta atratividade e alta palatabilidade. Camundongos costumam explorar novos objetos e alimentam-se esporadicamente, desta forma pode ser vantajoso remanejar as iscas raticida no ambiente.

Precauções: CONSERVE FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS E DOS ANIMAIS DOMÉSTICOS. CUIDADO! PERIGOSA SUA INGESTÃO, INALAÇÃO OU ABSORÇÃO PELA PELE. Manter o produto na embalagem original. Não reutilizar as embalagens vazias. Não aplicar sobre alimentos e utensílios de cozinha, plantas e aquários. Durante o manuseio, usar luvas e evitar contato com a pele, boca e olhos. Não comer, beber e nem fumar durante aplicação. Depois de aplicar o produto e, no caso de contato com a pele, lavar com água em abundância, em contato com os olhos, lavar com água em abundância. Só utilizar em local de difícil acesso a crianças e animais domésticos. Usar luvas, máscaras e proteção ocular. Não aplicar em tubulações de ar ou fontes de ventilação que possibilitem a liberação do rodenticida no ambiente. As mulheres grávidas não podem manipular o rodenticida. Conservar o local desratizado em perfeita condição de limpeza. Não transportar, nem armazenar com alimentos nem medicamentos. Produtos tóxico para mamíferos, aves e peixes. Não se deve contaminar os cursos d'água. Queimar ou enterrar os roedores mortos e eliminar o produto de forma segura. Advertir os usuários sobre as medidas e segurança e precauções a tomar para evitar acidentes. Formulação contém substância amargante que previne a ingestão acidental por humanos.



Fórmula molecular



Toxicologia

DL50 oral aguda para ratos..... 0,25 mg i.a/Kg

DL50 oral aguda para cachorros.... 0,25 mg i.a/Kg

DL50 oral aguda para gatos..... 0,25 mg i.a/Kg

Classificação toxicológica

Flocoumafen - Classe II

Período de reentrada

Não é necessário desocupar a área para realizar a aplicação.

Sinais e sintomas de intoxicação

Se houver ingestão do produto, poderá apresentar náuseas, vômito e após alguns dias, esquimoses sangramento excessivo após traumatismos, sangramento nasal e gengival, sangue nas fezes e urina hemorragias maciças nos casos mais graves, que poderá levar a morte. O aparecimento de sintomas tais como sangramento de gengivas ou outra parte do corpo é sugestivo de exposição excessiva ao produto, bem como outros sintomas hemorrágicos e de apatia.

Armazenagem

O produto deve ser armazenado a temperatura ambiente e em local prévio e adequadamente destinado a esta finalidade.

Vazamento acidental

Isolar a área. Usar luvas impermeáveis e recolher o produto para área de descarte de lixo químico.

Eliminação e descarte

Não reutilize as embalagens vazias. As sobras e resíduos dos produtos devem ser descartadas conforme a legislação municipal e/ou estadual vigente. As embalagens vazias devem devolvidas em um posto credenciado pelo fabricante.

Primeiros socorros

Em caso de intoxicação, procurar o Centro de Intoxicações ou Serviço de Saúde, levando a embalagem ou o rótulo do produto. Em caso de contato direto com produto lavar a parte atingida com água em abundância e sabão. Em caso de contato com os olhos, lavar imediatamente em água corrente em abundância. Se inalado em excesso, remover a pessoa para local ventilado. Em caso de ingestão não provoque o vômito.

FABRICADO POR: NEOGEN

Av. Alexandrina das Chagas Moreira, 964

CEP: 12412-800

Distrito Industrial, Pindamonhangaba/SP

CNPJ: 90.821.554/0001-42

Aut. Func. no MS nº: 3.00425-4

Indústria Brasileira - Site: www.rogama.com.br

E-mail: sac@neogen.com - SAC: (12) 3644.3030

INDICAÇÕES PARA USO MÉDICO

Princípio ativo: Flocoumafen

Grupo químico: Cumarínico

Antídoto/Tratamento: Vitamina K1 / Tratamento Sintomático

TELEFONE DE EMERGÊNCIA - 24 h:

0800 014 11 49

Nº de Registro no MS: 3.0425.0148.001-5

Nº do CAS: Flocoumafen: 90035-08-8



NEOGEN.com

sac@neogen.com | (12) 3644.3030